

Az antibiotikum-kezelések általában rombolják a tengerimalac bélflórájának egészségét.

Egyes antibiotikumok a tengerimalac számára mérgezők vagy rendkívül veszélyesek, a bélflóráját károsítják és visszafordíthatatlan, végzetes hasmenést okoznak, vagy végzetes allergiát idéznek elő nála. **Minden penicillin alapú antibiotikum mérgező a tengerimalac számára!** A tengerimalac kezelésében jártas állatorvos olyan antibiotikumot, amely e kisemlős számára toxikus vagy rendkívül veszélyes hatású, sosem alkalmaz, még abban az esetben sem, ha pillanatnyilag nem létezik más alternatíva.



A következő antibiotikumok a tengerimalac számára rendkívül veszélyesek vagy mérgezők, ha alkalmazásra kerülnek, állapotát csak tovább súlyosbítják, gyógyulási esélyeit még jobban csökkentik és/vagy halált okoznak:

Penicillin bármilyen formában, Amoxicillin (Clavamox), Eritromicin, Lincocin (Lincomicin, Lincorex), Streptomycin, Clortetracilin, Oxitetracilin, Dihidrostreptomycin, Ampicillin, Cephalexin, Cefadroxil, Cefalosporinok, Cefazolin, Clindamycin, Bacitracin, és ezek származékai.

Tengerimalacnál alkalmazható antibiotikum-készítmények (kizárólag az orvos utasítása szerint, az előirt adagban és ideig alkalmazva!):

- Baytril (Enrofloxacin) - csak felnőtt tengerimalacoknál alkalmazható, a növekedésben levők nem kaphatnak!
- Bactrim (Tribissen, Septra, SMZ-TMP, Trimethoprim sulfa, Trimethoprim-sulfamethoxazol) - megfelelő mennyiségben kölyök és növendék tengerimalacoknak is adható
- Cloramphenicol palmitate, Cloramphenicol succinate
- Sulfamethazine
- Doxiciclin (Vibramicin, Vibravet) - alkalmazása a vemhesség utolsó 3 hetében lévő nőstényeknél és 4 hetes korig az újszülött kölyköknél nem ajánlott, mert a kölykök fogzatának megmaradó (sárgás-szürkés-barnás) elszíneződését okozza.
- Tetracilin - adagolása nagyon nagy elővigyázatosságot igényel, mert egyes érzékenyebb egyedeknél a bélflórát nagymértékben károsítja.

A bél baktériumflórájának védelmére, a bélflóra egyensúlyának megőrzésére Bio-Lapis, Laktiferm, Probios, BeneBac, LactoBac vagy egyéb probiotikus készítményt ajánlott adni. A probiotikumot mindig 1-2 órával az antibiotikum adagolása után kell alkalmazni.

Antibiotikus kezelést orvosi javaslat nélkül sose alkalmazz!

Forrás:

John E. Harkness and Joseph E. Wagner, The Biology and Medicine of Rabbits and Rodents

V.C.G. Richardson, Diseases of Domestic Guinea Pigs

J. W. Carpenter, Exotic Animal Formulary

E. V. Hillyer and K. E. Quesenberry, Ferrets, Rabbits, and Rodents: Clinical Medicine and Surgery

© Copyright 2008 Mondovics Geda

www.gemon.ro